

緑内障点眼薬 フォーマラリー ①

<採用薬を持参した場合>

(PG系) キサラタン(ラタノール)

(β遮断) 禁忌あり  
チモプロール(チモロールマリン酸塩)

(炭酸脱水素阻害) 禁忌あり  
エイゾプト(プリゾラミド)

(α2刺激)  
アイファガン(ブリンゾニド酒石酸塩)

(ROCK阻害)  
グラナテック(リパシジル塩酸塩)

(副交感神経刺激)  
サンピロ(ピロカルピン塩酸塩)

入院中  
継続

<非採用薬を持参した場合>

(β遮断薬)

リズモンTG(チモロールマリン酸塩)  
ミケラン(カルテオロール塩酸塩)  
ハイパジール(ニフラジール)  
ニプラノール(ニフラジール)  
レボプロロール(レボプロロール塩酸塩)  
ベトプティック(ベタキロール塩酸塩)  
2023.3販売中止

入院中  
変更

チモプロール(チモロールマリン酸塩)  
1日2回

禁忌：気管支喘息、気管支痙攣又はその既往歴。重篤な慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全、洞性徐脈、房室ブロック(II、III)、心房性ショックの患者

(炭酸脱水素酵素阻害剤)

トルソプト  
(ドルゾラミド塩酸塩)

入院中  
変更

エイゾプト(プリゾラミド)  
1日2回  
(効果不十分な場合1日3回可)

禁忌：重篤な腎障害

\*禁忌に該当した場合は中止

院内標準薬

<非採用薬を持参した場合>

(PG関連薬)

タプロス(タフル<sup>o</sup>ロスト)  
トラバタンズ(トラボ<sup>o</sup>プロスト)  
ルミガン(ビマト<sup>o</sup>ロスト)

(EP2受容体作動薬)

エイベリス(ホミデ<sup>o</sup>パ<sup>o</sup>ブ<sup>o</sup>イ<sup>o</sup>ツ<sup>o</sup>ピ<sup>o</sup>ル)

(イオンチャンネル開口薬)

レスキュラ(イ<sup>o</sup>ツ<sup>o</sup>ピ<sup>o</sup>ル<sup>o</sup>ウ<sup>o</sup>ノ<sup>o</sup>ブ<sup>o</sup>ロスト)

入院中  
変更

キサラタン(ラタ<sup>o</sup>プロスト) 1日1回

( $\alpha$ 1遮断薬)

デタントール(ブナ<sup>o</sup>ジ<sup>o</sup>ン塩酸塩)

入院中  
中止


(副交感神経刺激薬)

ウブレチド(ジス<sup>o</sup>グ<sup>o</sup>シ<sup>o</sup>臭化物)

入院中  
中止

重症筋無力症(眼筋型)  
調節性内斜視の場合  
(サンピロに適応無し)

緑内障  
の場合



サンピロ(ピロ<sup>o</sup>カル<sup>o</sup>ピ<sup>o</sup>ン塩酸塩)

1日3~5回

# 緑内障点眼剤 フォーマリナー ③配合剤

\* 禁忌に該当した場合は中止

1日1回

ミケルナ (ラタノプロスト・カルテオロール塩酸塩)  
 ザラカム (ラタノプロスト・フェロルマリン酸塩)  
 タプコム (タフルプロスト・フェロルマリン酸塩)  
 デュオトラバ (トラボプロスト・フェロルマリン酸)



キサラタン (ラタノプロスト) 1日1回  
 +  
 チモプツール (フェロルマリン酸塩) 1日2回

禁忌：気管支喘息、気管支痙攣又はその既往歴。重篤な慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全、洞性徐脈、房室ブロック(II、III)、心房性ショックの患者

1日2回

コンプト (トルゾラミド・フェロルマリン酸塩)  
 アゾルガ (ブリゾラミド・フェロルマリン酸塩)




エイゾプト (ブリゾラミド) 1日2回  
 +  
 チモプツール (フェロルマリン酸塩) 1日2回

禁忌：重篤な腎障害

禁忌：気管支喘息、気管支痙攣又はその既往歴。重篤な慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全、洞性徐脈、房室ブロック(II、III)、心房性ショックの患者

1日2回

アイベータ  
 (プリモジンを酒石酸塩・フェロルマリン酸塩)



アイファガン (プリモジンを酒石酸塩) 1日2回  
 +  
 チモプツール (フェロルマリン酸塩) 1日2回

禁忌：気管支喘息、気管支痙攣又はその既往歴。重篤な慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全、洞性徐脈、房室ブロック(II、III)、心房性ショックの患者

1日2回

アイラミド  
 (プリモジンを酒石酸塩・ブリゾラミド)




アイファガン (プリモジンを酒石酸塩) 1日2回  
 +  
 エイゾプト (ブリゾラミド) 1日2回

禁忌：重篤な腎障害

1日2回

グラアルファ  
 (プリモジンを酒石酸塩・リバステジール塩酸塩)



アイファガン (プリモジンを酒石酸塩) 1日2回  
 +  
 グラナテック (リバステジール塩酸塩) 1日2回