

肝臓がん

原発性肝臓に対するCDDP(アイーコール)肝動脈塞栓・注入術	アイーコール点滴静注用	/1cm 10mg (max 100mg)	動脈注射 day1	1
原発性肝臓に対するEPI+リビドール肝動脈塞栓術(粉)	エピルピシン点滴静注用	/1cm 10mg (max 60mg)	動脈注射 day1	1
RAM単独療法(進行肝細胞癌、AFP \geq 400ng/mL)	サイラムザ点滴静注用	8 mg/kg	点滴静注 day1	14
レンビマ(肝細胞癌) 60kg以上	レンビマ錠	12 mg/分1	経口投与 連日	連日
レンビマ(肝細胞癌) 60kg以下	レンビマ錠	8 mg/分1	経口投与 連日	連日
スチバーガ療法(肝細胞癌)	スチバーガ錠	160 mg/分1	経口投与 day1-21	28
切除不能な肝細胞がんに対するネクサバル療法	ネクサバル錠	800 mg/分2	経口投与 連日	連日

胆道がん

GEM+CDDP療法(切除不能・進行胆道癌)	シスプラチン点滴静注用 ゲムシタピン点滴静注用	25 mg/m ² 1000 mg/m ²	点滴静注 day1,8 点滴静注 day1,8	21
進行胆管・胆嚢癌に対するゲムシタピン療法	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
胆道系悪性腫瘍(胆嚢癌、胆管癌、Vater乳頭部癌)	ティーエスワン配合錠	80-120 mg/分2	経口投与 day1-28	42

膵臓がん

FOLFIRINOX 2Ws毎(治癒切除不能膵癌)	エルプラット点滴静注用 イリノテカン点滴静注用 レポホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用	85 mg/m ² 180 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr)	14
mFOLFIRINOX(CPT減、bolusなし)(膵癌)	エルプラット点滴静注用 イリノテカン点滴静注用 レポホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用	85 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr)	14
進行膵臓癌に対するゲムシタピン療法	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
アブラキサン/GEM療法(膵臓癌) 4Ws毎	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28

	アブラキサン点滴静注用	125 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	20
進行膵がんのGEM耐性例に対するTS-1+GEM療法	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注 day8,15	21
	ティーエスワン配合錠	80-120 mg/分2	経口投与day1-14	
進行膵がんに対するTS-1療法	ティーエスワン配合錠	80-120 mg/分2	経口投与day1-28	42