

非小細胞肺癌

|                                       |  |  |  |    |
|---------------------------------------|--|--|--|----|
| CBDCA+cRT                             | カルボプラチン点滴静注用                               | 30 mg/m <sup>2</sup>                           | 点滴静注 RT併用20回                                       | 28 |
| CBDCA+CPT-11                          | カルボプラチン点滴静注用<br>イリノテカン点滴静注用                | 4-5 AUC<br>50 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8,15                        | 28 |
| CBDCA+GEM                             | カルボプラチン点滴静注用<br>ゲムシタピン点滴静注用                | 5 AUC<br>1000 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8                           | 21 |
| CBDCA+nab-PTX                         | カルボプラチン点滴静注用<br>アブラキサン点滴静注用                | 6 AUC<br>100 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8,15                        | 21 |
| Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX            | カルボプラチン点滴静注用<br>アブラキサン点滴静注用<br>テセントリク点滴静注用 | 6 AUC<br>100 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/body | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8,15<br>点滴静注 day1           | 21 |
| CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab           | カルボプラチン点滴静注用<br>アブラキサン点滴静注用<br>キイトルーダ点滴静注用 | 6 AUC<br>100 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/body  | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8,15<br>点滴静注 day1           | 21 |
| CBDCA+PEM NSCLC (進行/再発,nonSq)         | カルボプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用                  | 4-6 AUC<br>500 mg/m <sup>2</sup>               | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                             | 21 |
| BV+CBDCA+PEM (NSCLC, non-sq)          | カルボプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用<br>アバスチン点滴静注用    | 6 AUC<br>500 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg     | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                | 21 |
| Atezolizumab+CBDCA+PEM (NSCLC, nonSq) | カルボプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用<br>テセントリク点滴静注用   | 6 AUC<br>500 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/body | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                | 21 |
| CBDCA+PEM+キイトルーダ (進行/再発、nonSq)        | カルボプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用<br>キイトルーダ点滴静注用   | 5 AUC<br>500 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/body  | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                | 21 |
| wCBDCA+PTX+TRT (NSCLC) TRT併用          | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用               | 2 AUC<br>40 mg/m <sup>2</sup>                  | 点滴静注 day1,8,15,22,29,36<br>点滴静注 day1,8,15,22,29,36 | 42 |
| wCBDCA+PTX+TRT (NSCLC) TRT終了後         | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用               | 5 AUC<br>200 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                             | 21 |
| CBDCA+PTX NSCLC (再発/進行・術後)            | カルボプラチン点滴静注用                               | 6 AUC  | 点滴静注 day1  | 21 |

|   |   |   |  |    |
|---|---|---|--|----|
|   | パクリタキセル点滴静注用  | 200 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 day1  | 21 |
| BV+CBDCA+PTX NSCLC (nonSq)                    | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用<br>アバスチン点滴静注用                | 6 AUC<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg                    | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| BV維持療法 (BV+CBDCA+PTX) NSCLC (III B~IV, nonSq) | アバスチン点滴静注用  | 15 mg/kg  | 点滴静注 day1  | 21 |
| CBDCA+PTX+BV+アテゾリズマブ (ABCP療法) (NSCLC, nonSq)  | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用<br>アバスチン点滴静注用<br>テセントリク点滴静注用 | 6 AUC<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg<br>1200 mg/body    | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1 | 21 |
| BV+アテゾリズマブ (ABCP療法) 維持療法 (NSCLC, nonSq)       | テセントリク点滴静注用<br>アバスチン点滴静注用                                 | 1200 mg/body<br>15 mg/kg                                      | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                           | 21 |
| CBDCA+PTX+Pembrolizumab (扁平上皮癌)               | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用<br>キイトルーダ点滴静注用               | 6 AUC<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/body                 | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| CBDCA+TS-1 NSCLC (進行・再発)                      | カルボプラチン点滴静注用<br>ティーエスワン配合錠                                | 5 AUC<br>80-120 mg/body                                       | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1-14                        | 21 |
| CDDP+DTX+イマチニブ NSCLC (進行/再発・術後)               | シスプラチン点滴静注用<br>ドセタキセル点滴静注用                                | 80 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                  | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                           | 21 |
| CDDP+DTX+CRT+イマチニブ NSCLC (切除不能III期)           | シスプラチン点滴静注用<br>ドセタキセル点滴静注用                                | 60-80 mg/m <sup>2</sup><br>30-60 mg/m <sup>2</sup>            | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                           | 21 |
| CDDP+GEM+イマチニブ NSCLC (進行/再発)                  | シスプラチン点滴静注用<br>ゲムシタピン点滴静注用                                | 80 mg/m <sup>2</sup><br>1000 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8                         | 21 |
| CDDP+PEM+イマチニブ NSCLC (進行/再発, nonSq)           | シスプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用                                  | 75 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                           | 21 |
| CDDP+PEM+Atezolizumab (進行/再発, nonSq)          | シスプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用<br>テセントリク点滴静注用                   | 75 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/body | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| PEM+Atezolizumab 3Ws毎 維持療法 (進行/再発 nonSq)      | アリムタ点滴静注用<br>テセントリク点滴静注用                                  | 500 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/body                         | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                           | 21 |
| BV+CDDP+PEM NSCLC (進行・再発, nonSq)              | シスプラチン点滴静注用   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1  |    |

|   |   |  |                                     |    |
|---|---|--|-------------------------------------|----|
|   | アリムタ点滴静注用<br>アバスチン点滴静注用                 | 500 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg                            | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| CDDP+PEM+キイトルーダ (進行/再発、nonSq)                   | シスプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用<br>キイトルーダ点滴静注用 | 75 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/body | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1<br>点滴静注 day1 | 21 |
| PEM + キイトルーダ 維持療法 (nonSq) total 35cまで           | アリムタ点滴静注用<br>キイトルーダ点滴静注用                | 500 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/body                         | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| PEM NSCLC (進行/再発,nonSq)                         | アリムタ点滴静注用                               | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1                           | 21 |
| CDDP+TS1+イメト <sup>®</sup> NSCLC (進行/再発 IIIb~IV) | シスプラチン点滴静注用<br>ティーエスワン配合錠               | 60 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body                       | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 35 |
| CDDP+VNR+イメト <sup>®</sup> NSCLC (進行/再発・術後)      | シスプラチン点滴静注用<br>ビノレルピン点滴静注用              | 80 mg/m <sup>2</sup><br>25 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8            | 21 |
| CDDP+VNR+イメト <sup>®</sup> +RT NSCLC (III期進行/再発) | シスプラチン点滴静注用<br>ビノレルピン点滴静注用              | 80 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8            | 28 |
| ネダプラチン+DTX (NSCLC,Sq)                           | アクプラ点滴静注用<br>ドセタキセル点滴静注用                | 100 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| CPT11 3週毎 NSCLC (高齢者進行/再発)                      | イリノテカン点滴静注用                             | 60-100 mg/m <sup>2</sup>                                     | 点滴静注 day1,8                         | 21 |
| CPT11 4週毎 NSCLC/SCLC (進行/再発)                    | イリノテカン点滴静注用                             | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1,8,15                      | 28 |
| DTX 3週毎 NSCLC (進行/再発)                           | ドセタキセル点滴静注用                             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 day1                           | 21 |
| RAM + DTX (NSCLC) (通常)                          | ドセタキセル点滴静注用<br>サイラムザ点滴静注用               | 60 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/kg                             | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1              | 21 |
| イミフィンジ療法 (III期NSCLC放射線化学療法後)                    | イミフィンジ点滴静注用                             | 10 mg/kg   | 点滴静注 day1                           | 14 |
| GEM 3週毎 NSCLC (進行/再発)                           | ゲムシタピン点滴静注用                             | 1000 mg/m <sup>2</sup>                                       | 点滴静注 day1,8                         | 21 |
| アブラキサン単剤療法 (NSCLC)                              | アブラキサン点滴静注用                             | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1,8,15                      | 21 |
| オプジーボ <sup>®</sup> 療法 2週毎 (既治療例 進行/再発) NSCLC    | オプジーボ点滴静注用                              | 240 mg/body  | 点滴静注 day1                           | 14 |
| キイトルーダ (NSCLC) (3Ws毎)                           | キイトルーダ点滴静注用                             | 200 mg/body  | 点滴静注 day1                           | 21 |
| PTX 3週毎 NSCLC (進行/再発)                           | パクリタキセル点滴静注用                            | 210 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1                           | 21 |
| AMR NSCLC (既治療)                                 | カルセド点滴静注用                               | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 day1-3                         | 21 |
| テセントリク (NSCLC) (SCLC維持)                         | テセントリク点滴静注用                             | 1200 mg/body   | 点滴静注 day1                           | 14 |
| VNR 3週毎 NSCLC (進行/再発)                           | ビノレルピン点滴静注用                             | 20-25 mg/m <sup>2</sup>                                      | 点滴静注 day1,8                         | 21 |

|  |                     |                       |                           |       |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------|
| ジオトリフ内服療法                                | ジオトリフ錠              | 40 mg/分1              | 経口投与 連日                   | 連日    |
| アレセンサ (ALK陽性非小細胞肺癌)                      | アレセンサ錠              | 600 mg/分1             | 経口投与 連日                   | 連日    |
| ジカディア療法 (ALK陽性非小細胞肺癌)                    | ジカディア錠              | 450 mg/分1             | 経口投与 連日                   | 連日    |
| ザーコリ (ALK陽性)                             | ザーコリ錠               | 500 mg/分2             | 経口投与 連日                   | 連日    |
| ローブレナ療法 (ALK陽性非小細胞肺癌)                    | ローブレナ錠              | 100 mg/分1             | 経口投与 連日                   | 連日    |
| ダブラフェニブ/トラメチニブ療法 (BRAF、V600E肺癌)          | タフィンラーカプセル          | 300 mg/分2             | 経口投与 連日                   | 連日    |
|  | メキニスト錠              | 2 mg/分1               | 経口投与 連日                   | 連日    |
| エルロチニブ NSCLC (再発)                        | タルセバ錠               | 150 mg/分1             | 経口投与 連日                   | 連日    |
| BV+タルセバ EGFR(+) NSCLC (non-Sq)           | タルセバ錠<br>アバスチン点滴静注用 | 150 mg/分1<br>15 mg/kg | 経口投与 day1-21<br>点滴静注 day1 | 21    |
| ゲフィチニブ単剤療法 NSCLC (進行・切除不能)               | イレッサ錠               | 250 mg/body           | 経口投与 連日                   | 連日    |
| ゲフィチニブ +CBDCA+PEM同時併用 NSCLC(未治療進行、nonSq) | イレッサ錠               | 250 mg/分1             | 経口投与 day1-21              | 21    |
|  | カルボプラチン点滴静注用        | 6 AUC                 | 点滴静注 day1                 |       |
|  | アリムタ点滴静注用           | 500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 day1                 |       |
| ゲフィチニブ +PEM同時併用 維持療法 NSCLC (未治療進行、nonSq) | イレッサ錠               | 250 mg/分1             | 経口投与 day1-21              | 21    |
|  | アリムタ点滴静注用           | 500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 day1                 |       |
| オシメルチニブ (非小細胞肺癌)                         | タグリッソ錠              | 80 mg/分1              | 経口投与 day1-7               | 7     |
| TS1 NSCLC (2週1休)                         | ティーエスワン配合錠          | 80-120 mg/分2          | 経口投与 day1-14              | 21    |
| TS1 NSCLC (進行/再発) (4週2休)                 | ティーエスワン配合錠          | 80-120 mg/分2          | 経口投与 day1-28              | 35-48 |
| UFT療法 NSCLC (進行/再発・術後) (4週2休)            | ユーエフティー配合カプセル       | 300-600 mg/分3         | 経口投与 連日                   | 連日    |
| <b>小細胞肺癌</b>                             |                     |                       |                           |       |
| CBDCA+CPT11 4週毎 SCLC/NSCLC (進行/再発)       | カルボプラチン点滴静注用        | 4-5 AUC               | 点滴静注 day1                 | 28    |
|  | イリノテカン点滴静注用         | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1,8,15            |       |
| CBDCA+CPT-11(3週毎) ± seq.RT SCLC          | カルボプラチン点滴静注用        | 4 AUC                 | 点滴静注 day1                 | 21    |
|  | イリノテカン点滴静注用         | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1,8               |       |
| CBDCA+ETP SCLC (高齢者,PS不良の進行/再発)          | カルボプラチン点滴静注用        | 5 AUC                 | 点滴静注 day1                 | 21    |
|  | エトポシド点滴静注用          | 80 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1-3               |       |
| CBDCA+ETP SCLC (高齢者,PS不良の進行/再発) 透析用      | カルボプラチン点滴静注用        | 300 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 day1                 | 21    |
|  | エトポシド点滴静注用          | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1,3 (HD日)         |       |
| CBDCA+ETP+Atezolizumab (SCLC)            | カルボプラチン点滴静注用        | 5 AUC                 | 点滴静注 day1                 |       |

|   |  |  |                                       |    |
|---|--|--|---------------------------------------|----|
|   | エトポシド点滴静注用<br>テセントリク点滴静注用                | 100 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/body                                | 点滴静注 day1-3<br>点滴静注 day1              | 21 |
| CBDCA+PTX SCLC (進行/再発)                          | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用             | 5 AUC<br>175 mg/m <sup>2</sup>                                       | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                | 21 |
| CDDP+CPT11+イマド` 4週毎 SCLC (進行/再発)                | シスプラチン点滴静注用<br>イリノテカン点滴静注用               | 60 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                         | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8,15           | 28 |
| CDDP+ETP(分割)+イマド` SCLC (高齢者,PS不良の進行/再発)         | シスプラチン点滴静注用<br>エトポシド点滴静注用                | 25 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>                         | 点滴静注 day1-3<br>点滴静注 day1-3            | 21 |
| CDDP+ETP+イマド` SCLC (進行/再発)                      | シスプラチン点滴静注用<br>エトポシド点滴静注用                | 80 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup>                        | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1-3              | 21 |
| CDDP+ETP+CRT+イマド` LD-SCLC (進行/再発)               | シスプラチン点滴静注用<br>エトポシド点滴静注用                | 80 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup>                        | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1-3              | 28 |
| PEI(CDDP+VP-16+CPT-11) SCLC (進行/再発)             | シスプラチン点滴静注用<br>エトポシド点滴静注用<br>イリノテカン点滴静注用 | 25 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup><br>90 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1-3<br>点滴静注 day8 | 14 |
| AMR (40mg/m <sup>2</sup> ) 3週毎 (既治療例 進行/再発)SCLC | カルセド点滴静注用                                | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 day1-3                           | 21 |
| CPT11維持療法 4Ws (SCLC)                            | イリノテカン点滴静注用                              | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 day1,8,15                        | 28 |
| ノギテカン単剤療法 SCLC (進行/再発)                          | ハイカムチン点滴静注用                              | 0.8-1.0 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1-5                           | 21 |
| PTX SCLC (進行/再発)                                | パクリタキセル点滴静注用                             | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 day1                             | 21 |
| <b>悪性中皮腫</b>                                    |  |  |                                       |    |
| CBDCA+GEM (中皮腫)                                 | カルボプラチン点滴静注用<br>ゲムシタピン点滴静注用              | 5 AUC<br>1000 mg/m <sup>2</sup>                                      | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8              | 21 |
| CBDCA+PEM (悪性胸膜中皮腫)                             | カルボプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用                | 5 AUC<br>500 mg/m <sup>2</sup>                                       | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                | 21 |
| CDDP+GEM+イマド` (中皮腫)                             | シスプラチン点滴静注用<br>ゲムシタピン点滴静注用               | 80 mg/m <sup>2</sup><br>1000 mg/m <sup>2</sup>                       | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1,8              | 21 |
| CDDP+PEM+イマド` (中皮腫)                             | シスプラチン点滴静注用<br>アリムタ点滴静注用                 | 75 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup>                        | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1                | 21 |
| GEM+VNR (中皮腫)                                   | ゲムシタピン点滴静注用<br>ビノレルピン点滴静注用               | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>25 mg/m <sup>2</sup>                       | 点滴静注 day1,8<br>点滴静注 day1,8            | 21 |

|  |                              |  |                            |    |
|--|------------------------------|--|----------------------------|----|
| オプジーボ療法 2週毎（悪性胸膜中皮腫）                   | オプジーボ点滴静注用                   | 240 mg/body                                  | 点滴静注 day1                  | 14 |
| PEM 悪性胸中膜皮腫（進行/再発）                     | アリムタ点滴静注用                    | 500 mg/m <sup>2</sup>                        | 点滴静注 day1                  | 21 |
| 胸腺                                     |                              |  |                            |    |
| AMR 3週毎（40mg/m <sup>2</sup> ）（胸腺腫・胸腺癌） | カルセド点滴静注用                    | 40 mg/m <sup>2</sup>                         | 点滴静注 day1-3                | 21 |
| CBCDA+PTX+RT（胸腺癌）                      | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用 | 2 AUC<br>50 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴静注 day1,8<br>点滴静注 day1,8 | 21 |
| CBDCA + PTX（胸腺腫瘍）                      | カルボプラチン点滴静注用<br>パクリタキセル点滴静注用 | 6 AUC<br>200 mg/m <sup>2</sup>               | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1     | 21 |
| CDDP+DTX+イメド 胸腺癌（進行/再発・術前・術後）          | シスプラチン点滴静注用<br>ドセタキセル点滴静注用   | 80 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 day1<br>点滴静注 day1     | 21 |
| DTX（胸腺癌）                               | ドセタキセル点滴静注用                  | 60 mg/m <sup>2</sup>                         | 点滴静注 day1                  | 21 |
| GEM単剤 3週毎（胸腺癌）                         | ゲムシタピン点滴静注用                  | 1000 mg/m <sup>2</sup>                       | 点滴静注 day1,8                | 21 |
| GEM単剤 4週毎（胸腺癌）                         | ゲムシタピン点滴静注用                  | 1000 mg/m <sup>2</sup>                       | 点滴静注 day1,8,15             | 28 |
| スーテント（胸腺癌）（4投2休）                       | スーテントカプセル                    | 50 mg/分1                                     | 経口投与day1-28                | 42 |
| TS1（胸腺癌）（2投1休）                         | ティーエスワン配合錠                   | 80-120 mg/分2                                 | 点滴静注 day1-14               | 21 |
| TS1（胸腺癌）（4投2休）                         | ティーエスワン配合錠                   | 80-120 mg/分2                                 | 点滴静注 day1-28               | 42 |