

食道がん

局所進行胸部食道がんに対するstandarddose5-FU+CDDP+cRT療法	シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用	70 mg/m ² 700 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1-4	28
局所進行胸部食道がんに対するstandarddose5-FU+CDDP療法	シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用	80 mg/m ² 800 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1-5	28
III期・II期 胸部食道癌に対する5-FU+CDDP術前補助療法	シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用	80 mg/m ² 800 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1-5	21
DTX+CDDP+5-FU+E (切除不能又は再発食道癌)	シスプラチン点滴静注用 ドセタキセル点滴静注用 5-FU点滴静注用	80 mg/m ² 30 mg/m ² 800 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-5	28
進行再発の食道がんに対するDTX療法	ドセタキセル点滴静注用	70 mg/m ²	点滴静注 day1	21
DTX+TS-1 2Ws (食道癌)	ドセタキセル点滴静注用 ティーエスワン配合錠	40 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 点滴静注 day1-7、15-21	28
食道がんに対するDTX (通常) + TS-1療法	ドセタキセル点滴静注用 ティーエスワン配合錠	40 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
進行及び切除後再発食道癌に対するNED+5-FU療法	アクプラ点滴静注用 5-FU点滴静注用	90 mg/m ² 800 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1-5	28
weekly PTX療法 (食道癌)	バクリタキセル点滴静注用	100 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15,22,29,36	56
低量CDDP+5-FU療法(導入3コース)	シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用	6 mg/m ² 330 mg/m ²	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-7	14
低量CDDP+5-FU療法(4コース以降)	シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用	6 mg/m ² 330 mg/m ²	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-7	28

胃がん

XP 3Ws毎 (胃癌)	シスプラチン点滴静注用 ゼローダ錠	60-80 mg/m ² 2400-4200 mg/body	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
XP療法 (S-1術後補助後)	シスプラチン点滴静注用 ゼローダ錠	80 mg/m ² 2400-4200 mg/body	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
XP療法	シスプラチン点滴静注用 ゼローダ錠	80 mg/m ² 2400-4200 mg/body	点滴静注 day8 経口等投与 day 1-14	21
XP + HER 3Ws毎 (胃癌)	シスプラチン点滴静注用 ゼローダ錠	60-80 mg/m ² 2400-4200 mg/body	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
	ハーセプチン点滴静注用(初回)	8 mg/kg	点滴静注 day1	
	ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 day1	
低量CPT-11/CDDP療法 隔週投与(胃)	シスプラチン点滴静注用 イリノテカン点滴静注用	30 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1	14
進行・再発胃癌に対する低量CPT-11/CDDP療法	シスプラチン点滴静注用 イリノテカン点滴静注用	30 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1	14

SP療法 5Ws (進行・再発胃癌)	シスプラチン点滴静注用 ティーエスワン配合錠	60 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day8 経口投与day1-21	35
SP療法 3Ws (進行・再発胃癌)	シスプラチン点滴静注用 ティーエスワン配合錠	60 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
SP+HER療法 3Ws (進行・再発胃癌)	シスプラチン点滴静注用 ティーエスワン配合錠	60 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
	ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1	
進行胃癌に対するイリノテカン単剤療法	イリノテカン点滴静注用	150 mg/m ²	点滴静注 day1,15,29	49
Weekly DTX(通常)(胃)	ドセタキセル点滴静注用	25 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
weeklyDTX(通常)+HER(胃)	ドセタキセル点滴静注用	25 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
	ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1	
TS-1+DTX療法 3週毎	ドセタキセル点滴静注用 ティーエスワン配合錠	40 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
TS-1+DTX療法	ドセタキセル点滴静注用 ティーエスワン配合錠	20-50 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1,15 経口投与day1-7,15-21	28
FOLFOX療法(胃)	エルプラット点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用	85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr)	14
GEM療法(膵臓)	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
XELOX 100 進行胃癌 3Ws毎	エルプラット点滴静注用 ゼローダ錠	100 mg/m ² 2400-4200 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
XELOX 130 胃癌 進行再発、術後補助 3Ws毎	エルプラット点滴静注用 ゼローダ錠	130 mg/m ² 2400-4200 mg/分2	点滴静注 day 経口投与day1-14	21
HER + XELOX 130 胃癌	エルプラット点滴静注用 ゼローダ錠	130 mg/m ² 2400-4200 mg/分2	点滴静注 day 経口投与day1-14	21
	ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1	
SOX (100)(胃癌)	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠	100 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
SOX (130)(胃癌)	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠	130 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
HER+SOX 100 胃癌	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠	100 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
	ハーセプチン点滴静注用(初回)	8 mg/kg	点滴静注 day1	

	ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注 day1	
メトトレキサート+5-FU+I-LV療法 day1	メソトレキセート点滴静注用 5-FU点滴静注用 レボホリナート点滴静注用	30 mg/m ² 500~750 mg/body 50 mg/body	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day2	7
腹膜転移を有する進行・再発胃癌に対するMTX+5-FU時間差+LV静注	メソトレキセート点滴静注用 ロイコボリン注 5-FU点滴静注用	100 mg/m ² 10 mg/m ² 600 mg/m ²	点滴静注 day1 MTX24時間後から6時間毎6回 点滴静注 day1-3	7
腹膜転移を有する進行・再発胃癌に対するMTX+5-FU時間差+LV内服	メソトレキセート点滴静注用 ロイコボリン錠 5-FU点滴静注用	100 mg/m ² 10 mg/m ² 600 mg/m ²	点滴静注 day1 MTX24時間後から6時間毎6回 点滴静注 day1	7
低用量アブラキサン 3Ws毎 (胃癌)	アブラキサン点滴静注用	180 mg/m ²	点滴静注 day1	21
アブラキサン毎週投与方法 (胃)	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	21
weekly nabPTX+RAM (胃)	アブラキサン点滴静注用 サイラムザ点滴静注用	100 mg/m ² 8 mg/kg	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1,15	28
オブジーボ療法 (既治療胃癌) 240mg/body	オブジーボ点滴静注用	240 mg/body	点滴静注 day1	14
進行再発胃癌に対する5-FU vs PTXのB群(パクリタキセル)療法	パクリタキセル点滴静注用	80 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
パクリタキセル療法100mg未満 毎週投与 (胃)	パクリタキセル点滴静注用	65 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
weeklyPTX+HER(PTX<100mg) (胃)	パクリタキセル点滴静注用 ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	65 mg/m ² 8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1 点滴静注 day1	28
HER+PTX	パクリタキセル点滴静注用 ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	80 mg/m ² 8 mg/kg 6 mg/kg	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1 点滴静注 day1	28 21
weeklyPTX+RAM療法	パクリタキセル点滴静注用 サイラムザ点滴静注用	80 mg/m ² 8 mg/kg	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1,15	28
RAM単独療法	サイラムザ点滴静注用	8 mg/kg	点滴静注 day1,15	28
TS-1【4週2休】	ティーエスワン配合錠	80-120 mg/m ²	経口投与 day1-28	42
TS-1【2週1休】	ティーエスワン配合錠	80-120 mg/m ²	経口投与 day1-14	21
TS-1隔日投与方法【1日投与1日休薬】	ティーエスワン配合錠	80-120 mg/m ²	点滴静注 day1-14(隔日)	21
HER+TS-1 (胃癌) (4投2休)	ティーエスワン配合錠 ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	80-120 mg/分2 8 mg/kg 6 mg/kg	経口投与day1-28 点滴静注 day1 点滴静注 day22	42
HER+TS-1 (胃癌) (2投1休)	ティーエスワン配合錠 ハーセプチン点滴静注用(初回) ハーセプチン点滴静注用(2回目以降)	80-120 mg/分2 8 mg/kg 6 mg/kg	経口投与day1-14 点滴静注 day1 点滴静注 day1	21
大動脈内動注化学療法 (導入3コース)	メソトレキセート点滴静注用 シスプラチン点滴静注用	6 mg/m ² 6 mg/m ²	点滴静注 day1-5 動注 day1-5	14

	5-FU点滴静注用 レボホリナート点滴静注用	150 mg/m ² 15 mg/m ²	持続動注 day1-5 点滴静注 day2-6	
大動脈内動注化学療法（4コース以降）	メソトレキセート点滴静注用 シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用 レボホリナート点滴静注用	6 mg/m ² 6 mg/m ² 150 mg/m ² 15 mg/m ²	点滴静注 day1-5 動注 day1-5 持続動注 day1-5 点滴静注 day2-6	28
大腸がん				
5-FU+I-LV療法 sLV5FU2 for CRC(インフューザ [®] -用) (大腸)	5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用 レボホリナート点滴静注用	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr)	14
sLV5FU2+BV(5mg/kg) for CRC(インフューザ [®] -用) (大腸)	5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 アバスチン点滴静注用	400 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr) 点滴静注 day1	14
肛門管癌に対する 5-FU+MMC療法	5-FU点滴静注用 マイトマイシン点滴静注用	1000 mg/m ² 100 mg/m ²	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1	28
CPT-11単独療法【B法】（進行・再発大腸癌）	イリノテカン点滴静注用	150 mg/m ²	点滴静注 day1,15	35
XELIRI + BV (BSA < 1.31)	イリノテカン点滴静注用 ゼローダ錠 アバスチン点滴静注用	200 mg/m ² 1800-3600 mg/分2 7.5 mg/kg	点滴静注 day1 経口投与 day1-14 点滴静注 day1	21
Cet+CPT-11隔週療法（大腸）	イリノテカン点滴静注用 【初回】 アービタックス点滴静注用 アービタックス点滴静注用 【2コース目以降】 アービタックス点滴静注用	150 mg/m ² (初回) 400 mg/m ² (2回目以降) 250 mg/m ² 250 mg/m ²	点滴静注 day1,15,29 点滴静注 day1 点滴静注 day8,15,22,29,36,43 点滴静注 day1,8,15,22,29,36,43	49
P-mab+CPT-11療法（進行・再発 結腸・直腸癌）	イリノテカン点滴静注用 ベクティビックス点滴静注用	150 mg/m ² 6 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1	14
進行再発大腸がんに対するCPT-11+TS-1(IRIS)療法	イリノテカン点滴静注用 ティーエスワン配合錠	125 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1,15 経口投与 day1-14	28
CPT-11+TS-1(IRIS)+BV療法	イリノテカン点滴静注用 ティーエスワン配合錠 アバスチン点滴静注用	100 mg/m ² 80-120 mg/分2 5 mg/kg	点滴静注 day1,15 経口投与 day1-14 点滴静注 day1	28
Pmab + IRIS	イリノテカン点滴静注用 ティーエスワン配合錠 ベクティビックス点滴静注用	100 mg/m ² 80-120 mg/分2 6 mg/kg	点滴静注 day1,15 経口投与 day1-14 点滴静注 day1,15	28

FOLFIRI療法 (インフューザ [®] -)	イリノテカン点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr)	14
AFB+FOLFIRI (大腸、2nd)	イリノテカン点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用 ザルトラップ点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 4 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr) 点滴静注 day1	14
FOLFIRI (インフューザ [®] -) +BV5mg/kg療法	イリノテカン点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用 アバスチン点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr) 点滴静注 day1	14
Cet+FOLFIRI療法 (インフューザ [®] -)	イリノテカン点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr)	14
	【初回】 アービタックス点滴静注用 アービタックス点滴静注用	(初回) 400 mg/m ² (2回目以降)250 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day8	
	【2コース目以降】 アービタックス点滴静注用	250 mg/m ²	点滴静注 day1,8	
FOLFIRI (インフューザ [®] -) +P-mab 2Wsごと	イリノテカン点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用 ベクティビックス点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 6 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr) 点滴静注 day1	14
RAM + FOLFIRI (大腸、2nd)	イリノテカン点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用 5-FU点滴静注用 サイラムザ点滴静注用	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 8 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr) 点滴静注 day1	14
mFOLFOX6療法 (インフューザ [®] -)	エルプラット点滴静注用 レボホリナート点滴静注用 5-FU点滴静注用	85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1	14

	5-FU点滴静注用	2400 mg/m ²	点滴静注 day1-2(46hr)	
mFOLFOX6(インテリゲンチカリン)+BV5mg/kg療法	エルプラット点滴静注用	85 mg/m ²	点滴静注 day1	14
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	400 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	2400 mg/m ²	点滴静注 day1-2(46hr)	
	アバスタチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day1	
mFOLFOX6 + Cet (1クール目) (インテリゲンチカリン)	エルプラット点滴静注用	85 mg/m ²	点滴静注 day1	14
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	400 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	2400 mg/m ²	点滴静注 day1-2(46hr)	
	【初回】			
	アービタックス点滴静注用	(初回) 400 mg/m ²	点滴静注 day1	
	アービタックス点滴静注用	(2回目以降)250 mg/m ²	点滴静注 day8	
	【2コース目以降】	250 mg/m ²	点滴静注 day1,8	
	アービタックス点滴静注用			
mFOLFOX6 (インテリゲンチカリン) +P-mab 2Wsごと	エルプラット点滴静注用	85 mg/m ²	点滴静注 day1	14
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	400 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	2400 mg/m ²	点滴静注 day1-2(46hr)	
	ベクティビックス点滴静注用	6 mg/kg	点滴静注 day1	
FOLFOXIRI+BV療法 (進行再発大腸癌) 2w毎	エルプラット点滴静注用	85 mg/m ²	点滴静注 day1	14
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day1	
	イリノテカン点滴静注用	150 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	2400 mg/m ²	点滴静注 day1-2(46hr)	
	アバスタチン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day1	
FOLFOXIRI+Cet療法 (進行再発大腸癌) 2週毎	エルプラット点滴静注用	85 mg/m ²	点滴静注 day1	14
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day1	
	イリノテカン点滴静注用	150 mg/m ²	点滴静注 day1	
	5-FU点滴静注用	2400 mg/m ²	点滴静注 day1-2(46hr)	
	【初回】			
	アービタックス点滴静注用	(初回) 400 mg/m ²	点滴静注 day1	
	アービタックス点滴静注用	(2回目以降)250 mg/m ²	点滴静注 day8	
	【2コース目以降】	250 mg/m ²	点滴静注 day1,8	
	アービタックス点滴静注用			
FOLFOXIRI+Pmab療法 2Wsごと (切除不能進行・再発大腸癌)	エルプラット点滴静注用	85 mg/m ²	点滴静注 day1	14
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day1	

	イリノテカン点滴静注用 5-FU点滴静注用 ベクティビックス点滴静注用	150 mg/m ² 2400 mg/m ² 6 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1-2(46hr) 点滴静注 day1	
進行再発の結腸・直腸がんに対するXELOX 3Wsごと	エルプラット点滴静注用 ゼローダ錠	130 mg/m ² 2400-4200 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
進行再発の結腸・直腸がんに対するXELOX-BV 3Wごと	エルプラット点滴静注用 ゼローダ錠 アバスチン点滴静注用	130 mg/m ² 2400-4200 mg/分2 7.5 mg/kg	点滴静注 day1 経口投与day1-14 点滴静注 day1	21
TS-1/L-OHP(100)(SOX)療法 (術後補助)	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠	100 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
TS-1/L-OHP(130)(SOX)療法 (術後補助)	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠	130 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
SOX療法 (BSA<1.25) 【大腸癌】	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠	130 mg/m ² 80-120 mg/分2	点滴静注 day1 経口投与day1-14	21
SOX + BV (BSA<1.25) 【大腸癌】	エルプラット点滴静注用 ティーエスワン配合錠 アバスチン点滴静注用	130 mg/m ² 80-120 mg/分2 7.5 mg/kg	点滴静注 day1 経口投与day1-14 点滴静注 day1	21
Cet単独療法 (大腸) 1クール目	【初回】 アービタックス点滴静注用 アービタックス点滴静注用 ----- 【2コース目以降】 アービタックス点滴静注用	(初回) 400 mg/m ² (2回目以降)250 mg/m ² ----- 250 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day8 ----- 点滴静注 day1,8	7
P-mab 2Ws	ベクティビックス点滴静注用	6 mg/kg	点滴静注 day1	14
PTX療法 (直腸扁平上皮癌)	バクリタキセル点滴静注用	65-80 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15	28
Cape+RT (下部直腸粘膜下層浸潤癌pT1)	ゼローダ錠	1800-3000 mg/分2	経口投与day1-5(放射線併用)	7x5回
Cape + BV	ゼローダ錠 アバスチン点滴静注用	2400-4200 mg/分2 7.5 mg/kg	経口投与day1-14 点滴静注 day1	21
ロンサーフ + BV	ロンサーフ配合錠 アバスチン点滴静注用	70-150 mg/分2 5 mg/kg	経口投与day1-5,8-12 点滴静注 day1,15	28
BV+TS-1 (進行再発結腸・直腸癌)	ティーエスワン配合錠 アバスチン点滴静注用	80-120 mg/分2 5 mg/kg	経口投与day1-28 点滴静注 day1,15,29	42
UFT/UZEL + BV	ユーエフティー配合カプセル ユーゼル錠 アバスチン点滴静注用	300-600 mg/分3 75 mg/分1 5 mg/kg	経口投与day1-21 経口投与day1 点滴静注 day1,15	28
FP療法 (肛門扁平上皮癌) 4w毎	シスプラチン点滴静注用 5-FU点滴静注用	70 mg/m ² 700 mg/m ²	点滴静注 day2 点滴静注 day1-5	28