

神経膠腫（グリオーマ）

テモゾロミド療法（初発例）☒	テモダールカプセル	75 mg/m ² /分1	経口投与day1-42	70
テモゾロミド静注（初発例）	テモゾロミド点滴静注用	75 mg/m ² /分1	点滴静注 day1-42	70
テモゾロミド療法（初発RT後or再発例）（150mg/m ² ）	テモダールカプセル	150 mg/m ² /分1	経口投与day1-5	28
テモゾロミド療法（初発RT後or再発例）☒200mg/m ² ）	テモダールカプセル	200 mg/m ² /分1	経口投与day1-5	28
テモゾロミド静注（初発RT終了後および再発例）（150mg/m ² ）	テモゾロミド点滴静注用	150 mg/m ² /分1	点滴静注 day1-5	28
テモゾロミド静注（初発RT終了後および再発例）（200mg/m ² 増量）	テモゾロミド点滴静注用	200 mg/m ² /分1	点滴静注 day1-5	28
テモゾロミド+アバスチン初発RT併用	テモゾロミド点滴静注用 アバスチン点滴静注用	75 mg/m ² /分1 10 mg/kg	点滴静注 day1-14 点滴静注 day1	14
アバスチン+テモゾロミド 初発維持療法期【内服】	テモダールカプセル アバスチン点滴静注用	150又は200 mg/m ² /分1 10 mg/kg	経口投与 day1-5 点滴静注 day1,15	28
アバスチン+テモゾロミド 初発維持療法期【点滴】	テモゾロミド点滴静注用 アバスチン点滴静注用	150又は200 mg/m ² /分1 10 mg/kg	経口投与 day1-5 点滴静注 day1,15	28
アバスチン単剤【再発】（15mg/kg）	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day1	21
ギリアデル（悪性神経膠腫）	ギリアデル脳内留置用	8 枚/body	点滴静注 day1	1