

皮膚がん				
有棘細胞癌に対するカルボプラチン/エピルビシン療法	カルボプラチン点滴静注用 エピルビシン点滴静注用	200-400 mg/m <sup>2</sup> 30-60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day2	21
バベンチオ療法（根治切除不能なメルケル細胞癌）	バベンチオ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day1	14
悪性黒色腫（メラノーマ）				
ヤーボイ療法（悪性黒色腫）	ヤーボイ点滴静注用	3 mg/kg	点滴静注 day1	21
オプジーボ療法 抗PD-1抗体 2Ws毎（悪性黒色腫）	オプジーボ点滴静注用	240 mg/body	点滴静注 day1	14
Nivolumab+Ipilimumab（悪性黒色腫）	オプジーボ点滴静注用 ヤーボイ点滴静注用	80 mg/body 3 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1	21
Nivolumab+Ipilimumab維持療法（悪性黒色腫）	オプジーボ点滴静注用	240 mg/body	点滴静注 day1	14
キイトルーダ療法（根治切除不能な悪性黒色腫）	キイトルーダ点滴静注用	200 mg/body	点滴静注 day1	21
DAV+フェロニ：効なし	ダカルバジン注射用 ニドラン注 オンコピン注射用 フェロン	80-140 mg/m <sup>2</sup> 50-80 mg/m <sup>2</sup> 0.5-0.8 mg/m <sup>2</sup> 300 万単位/body	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1 点滴静注 day1 皮下注射day1-5,8-12	28
肉腫				
DXR+IFM（肉腫）	注射用イホマイド ドキシソルビシン点滴静注用	2 g/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-2	21
ドキシル療法(感染 Liposomal DTX)	ドキシル点滴静注用	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	21
小細胞がん				
CDDP+CPT-11 4W毎（小細胞癌）	シスプラチン点滴静注用 イリノテカン点滴静注用	60 mg/m <sup>2</sup> 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	28
ゲノム治療				
ペンブロリズマブ 3Ws 毎（MSI-Highを有する固形癌）	キイトルーダ点滴静注用	200 mg/body	点滴静注 day1	21
原発不明癌				
CBDCA+CPT-11 原発不明癌（進行/再発）	カルボプラチン点滴静注用 イリノテカン点滴静注用	4-5 AUC 50-60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	28
CBDCA+PTX 原発不明癌（進行/再発）	カルボプラチン点滴静注用 パクリタキセル点滴静注用	6 AUC 200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1	21
CDDP+DTX+イマテ 原発不明癌（進行/再発・術後）	シスプラチン点滴静注用	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	21

	ドセタキセル点滴静注用	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	
CDDP+GEM+イメト <sup>®</sup> 原発不明癌 (進行/再発)	シスプラチン点滴静注用 ゲムシタビン点滴静注用	80 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8	21
GEM 原発不明癌 (進行/再発)	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8,15	21
<b>神経内分泌腫瘍</b>				
膵神経内分泌腫瘍の肝転移に対する TACE(EPI+リ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> ール)	エピルピシン点滴静注用	10mg /1cm (max 1mg)	点滴静注 day1	14
エベロリムス療法 (神経内分泌腫瘍)	アフィニトール錠	10 mg/分1	経口投与 連日	連日
ストレプトゾシン【Daily法】 (膵・消化管NET)	ザノサー点滴静注用	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1-5	42
ストレプトゾシン【1週毎・1000mg/m <sup>2</sup> 】 (膵・消化管NET)	ザノサー点滴静注用	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8,15,22,29	42
ストレプトゾシン【1週毎1250mg/m <sup>2</sup> 】 (膵・消化管NET)	ザノサー点滴静注用	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	7
ストレプトゾシン【1週毎1500mg/m <sup>2</sup> 】 (膵・消化管NET)	ザノサー点滴静注用	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	7
スニチニブ (スーテント) 神経内分泌腫瘍	スーテントカプセル	37.5~50 mg/分1	経口投与 連日	連日
<b>胚細胞腫瘍</b>				
BEP療法+イメト <sup>®</sup> (胚細胞腫瘍) BSA<1.5	ブレオ点滴静注用 エトポシド点滴静注 シスプラチン点滴静注用	30 mg/body 100 mg/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day2,9,16 点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5	21
ETP+CDDP+イメト <sup>®</sup> +アロキ <sup>®</sup> (EP療法) (胚細胞腫瘍)	シスプラチン点滴静注用 エトポシド点滴静注	20 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5	21
卵巣胚細胞腫瘍再発例に対するビ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ラスチン+イメト <sup>®</sup> +シスプラチン療法 VelP療法 (胚細胞腫瘍)	エクザール点滴静注用 注射用イホマイド <sup>®</sup> シスプラチン点滴静注用	0.11 mg/kg 1.2 g/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1-2 点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5	21
シスプラチン+イメト <sup>®</sup> +イホマイド <sup>®</sup> 【VIP】療法 (胚細胞腫瘍)	エトポシド点滴静注 注射用イホマイド <sup>®</sup> シスプラチン点滴静注用	75 mg/m <sup>2</sup> 1.2 g/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5	21
<b>軟部腫瘍</b>				
骨・軟部肉腫に対するDXR単剤療法	ドキシソルピシン点滴静注用	20-30 mg/body	点滴静注 day1-3	21
ハラヴェン療法 (進行再発軟部肉腫)	ハラヴェン点滴静注用	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8	21
ヨンデリス療法 (悪性軟部腫瘍)	ヨンデリス点滴静注用	1.2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	21
パゾパニブ内服療法 (悪性軟部腫瘍)	ヴォトリエント錠	800 mg/分1	経口投与 連日	連日
PTX療法 (軟部肉腫) q 4 w	パクリタキセル点滴静注用	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8,15	28

消化管間質腫瘍 (GIST)				
スニチニブ (スーテント) GIST	スーテントカプセル	50 mg/分1	経口投与day1-28	42
レゴラフェニブ (スチバーガ) GIST	スチバーガ錠	160 mg/分1	経口投与day1-21	28
GISTに対するメシル酸イマチニブ療法(GIST グリベック)	グリベック錠	400 mg/分1	経口投与 連日	連日
悪性褐色細胞腫				
悪性褐色細胞腫に対するCVD療法	ダカルバジン注射用	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1-2	28
	エンドキサン点滴静注	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	
	オンコビン注射用	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	
リツキシマブ療法 (ネフローゼ) (6ヶ月毎)	リツキサン点滴静注用	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1	180