

| リウマチ疾患 | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|----|
| 治療抵抗性リウマチ性疾患に対するCPA点滴療法(1-2Ws)☑00mg | エンドキサン点滴静注 | 500 mg/body | 点滴静注 day1 | 7 |
| 治療抵抗性リウマチ性疾患に対するCPA療法(1-2Ws)☑50mg/m ² | エンドキサン点滴静注 | 350 mg/m ² | 点滴静注 day1 | 7 |
| 治療抵抗性リウマチ性疾患に対するCPA点滴療法☑3-4Ws) | エンドキサン点滴静注 | 700 mg/m ² | 点滴静注 day1 | 21 |
| 治療抵抗性リウマチ性疾患に対するC P A内服療法☑ | エンドキサン錠 | 2-5 mg/kg | 内服投与 連日 | 連日 |
| リツキシマブ療法 (ANCA関連血管炎等) | リツキサン点滴静注用 | 375 mg/m ² | 点滴静注 day1 | 7 |
| 非がん | | | | |
| C P A療法 間質性肺炎 | エンドキサン点滴静注 | 500 mg/body | 点滴静注 day1 | 7 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 (ITP)に対するリツキシマブ療法 | リツキサン点滴静注用 | 375 mg/m ² | 点滴静注 day1 | 7 |
| Ruxolitinib療法 (骨髄線維症) | ジャカビ錠 | 10-50 mg/分2 | 内服投与 連日 | 連日 |
| Ruxolitinib療法 (真性多血症) | ジャカビ錠 | 10-50 mg/分2 | 内服投与 連日 | 連日 |
| C P A療法 (多発性硬化症) | エンドキサン点滴静注 | 800 mg/m ² | 点滴静注 day1 | 28 |
| 処置等 | | | | |
| MMC療法 (緑内障手術の局所使用) | マイトマイシン点滴静注用 | 0.04 mg/body | 点滴静注 day1 | 1 |
| MMC療法 (翼状片手術の局所使用) | マイトマイシン点滴静注用 | 0.04 mg/body | 点滴静注 day1 | 1 |
| OK432胸腔内注入療法 | ピシバニール注射用 | 5 KE/body | 胸腔内注入day1 | 1 |
| ピシバニール胸膜癒着術 (胸膜炎) | ピシバニール注射用 | 5-10 KE/body | 胸腔内投与day1 | 1 |
| OK432注入療法 (がま腫) | ピシバニール注射用 | 0.5-2 KE/body | 膿疱腔内投与day1 | 1 |
| BLM心嚢注入癒着術 癌性心膜炎 | ブレオ点滴静注用 | 10-15 mg/body | 心注day1 | 2 |
| リンパ管腫によるOK-4 3 2による硬化療法 | ピシバニール注射用 | 2 KE/body | 局所・病巣内投与day1 | 1 |